

46. LÉON GAGNEPAIN — Sur le *Budleia curviflora*. — Le *Budleia curviflora* a été insuffisamment décrit par Hooker et Arnott (in *Botany of Captain Beechey's Voyage*, p. 267), un peu plus longuement dans Benthams (*Prodr.*, X, p. 445) : il était donc très difficile d'identifier des échantillons avec ces deux descriptions.

Franchet (*Enum. Pl. Jap.*, I, p. 322), Miquel (*Prol.*, p. 63), André (in *Ill. hortic.*, XVII (1870), p. 133; *Revue hortic.*, (1870), p. 337); Maximowicz (*Mél. Biol.*, X, p. 674) ont méconnu le *B. curviflora* et l'ont confondu avec une autre espèce. Tous le décrivent avec une tige ailée et à quatre angles et quelques-uns avec des fleurs courbées à la base. Je n'ai pu éviter la même erreur dans ma précédente note.

Hemsley, dans une courte allusion (in *Journ. Linn. Soc.*, XXVI, p. 119, in obs.) distingue ce soi-disant *B. curviflora* des auteurs sous le nom de *B. japonica* Hemsl. Mais la description qu'il en donne est bien incomplète et il était difficile de la reconnaître.

M. Hayata m'a envoyé du Japon le *B. japonica* Hemsl. Il concorde absolument avec ce que les auteurs ont décrit jusqu'ici comme *B. curviflora* (1).

Le *B. curviflora* Hook. et Arn. existe pourtant au Muséum. En effet, à côté du *B. japonica* Hemsl., il y a dans l'Herbier une espèce voisine qui concorde bien avec le *B. curviflora* Hook. et Arn.; mais la description des feuilles par ces auteurs et par Benthams est si peu précise que ces échantillons, d'ailleurs identiques au *B. curviflora*, peuvent être compris dans cette espèce comme forme, que je propose d'appeler *deltoidea*.

En présence des difficultés d'interprétations des diagnoses incomplètes de part et d'autre, il est bon de préciser les différences entre ces espèces.

Le *B. curviflora* Hook. et Arn. diffère du *B. japonica* Hemsl. : 1° par sa tige qui n'est ni ailée ni à 4 angles; 2° par

(1) Mes bien sincères remerciements à M. Hayata pour l'empressement dont il a fait preuve en me communiquant sans délai l'échantillon dont j'avais besoin.



sa fleur qui est courbée au milieu et non pas au tiers inférieur ; 3° par ses étamines insérées au niveau de la courbure, c'est-à-dire au milieu et non pas au tiers inférieur : 4° par ses feuilles ovales, longuement acuminées, très peu en coin, quelquefois triangulaires à la base, faiblement décurrentes et atténuées sur le pétiole.

Ces deux espèces ont encore entre elles une différence relative à leur habitat :

*B. curviflora*. — Iles Liu-chiu [*Wright*]. Japon : prov. Kii, Miura, mai 1888 ; Jejekushi, Satsuma, août 1888 [*sans nom de collecteur, Expos. 1889*] ; Kiu-siu, près de Kagosima, n° 4019, juin 1900 [*Faurie*].

*B. japonica*. — Japon : Hayachine, 23 août 1894, n° 13519 [*Faurie*] ; montagnes de Nikko, n° 2180 [*Savatier*] ; Shinano, 19 août 1903 [*Y. Yabei*].

47. HENRI LECOMTE. — Deux nouveaux *Eriocaulon* d'Indo-Chine. — Dans un voyage récent que nous avons entrepris en Indo-Chine, nous avons eu l'occasion de rencontrer de nombreux *Eriocaulon*, soit dans les rizières abandonnées, soit dans les mares de divers endroits, en particulier de Dalat, soit dans les sables humides du Sud-Annam et du Cambodge. Notons en passant que nous avons recueilli en assez grande quantité, sur le bord de la route qui va de Pnom-penh à Kampot, dans les sables, des échantillons du curieux *Eriocaulon* que nous avons autrefois décrit sous le nom de *Eriocaulon nautiliforme* H. Lec.<sup>1</sup>.

ERIOCAULON ORIZETORUM Hook. f. — Cambodge : route de Pnom-penh à Kampot, n° 1694 [*Lecomte et Finet*].

E. TRUNCATUM Ham. — Tonkin : Traï-hutt à Yen-bay, n° 631 ; Langson à Nuoc-binh, n° 308 [*Lecomte et Finet*].

var. QUADRICOSTATA H. Lecomte : hampe à quatre côtés,

1. L. Morot, *Journal de Botanique* (1908).